

*CATALOGUE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM  
CORRESPONDANT A L' « HISTOIRE NATURELLE  
DES MOLLUSQUES » DE FÉRUSSAC*  
(4<sup>e</sup> partie)

Par H. CHEVALLIER

1. — **Avertissement.**

La quatrième partie de notre catalogue<sup>1</sup> va comprendre les espèces héliciformes de Pulmonés terrestres non mentionnées dans le « Prodrôme » de FÉRUSSAC. Une grande partie de ces espèces est décrite par DESHAYES dans le tome I de l'« Histoire Naturelle des Mollusques » (genre *Helix*). D'autres espèces sont mentionnées dans un article ou dans une monographie de FÉRUSSAC. Les espèces restantes sont, soit des espèces créées par des auteurs contemporains de FÉRUSSAC, soit des espèces créées par FÉRUSSAC mais demeurées le plus souvent à l'état de *nomen nudum*.

Notre prochaine publication comprendra un Index groupant toutes les espèces héliciformes de Pulmonés terrestres mentionnées dans les quatre premières parties de notre catalogue.

2. — **Catalogue** (suite).

IV. — PULMONÉS TERRESTRES HELICIFORMES  
NON MENTIONNÉS DANS LE « PRODRÔME » DE FÉRUSSAC.

A. — *Espèces décrites par DESHAYES.*

(Genre **Helix**, Hist. des Moll., tome I).

Pour l'édition de 1851 de l'« Histoire Naturelle des Mollusques », nous citerons les espèces représentées dans les collections du Muséum par des exemplaires ayant été étudiés par DESHAYES. Nous mentionnerons cependant les espèces de FÉRUSSAC, de DESHAYES et de VALENCIENNES dont les types n'ont pas été

1. Pour les trois premières parties, voir le *Bull. Mus.*, t. 37, 1965, pp. 162-172 ; t. 37, 1965, pp. 476-489 et t. 37, 1965, pp. 678-689.

retrouvés. Nous rappelons que les exemplaires étudiés par DESHAYES proviennent, soit de l'ex-collection FÉRUSSAC, soit de l'ex-collection RANG, soit de diverses autres collections du Muséum (récoltes de d'ORBIGNY, de QUOY et GAIMARD, etc.), soit, enfin, de la collection personnelle de DESHAYES. Nous indiquerons par les termes « Muséum » ou « au Muséum » les exemplaires provenant de collections du Muséum autres que les collections FÉRUSSAC et RANG. Les lots n'ayant pas les mentions « Muséum » ou « coll. Rang » se rapporteront à la collection FÉRUSSAC. Nous continuerons aussi à indiquer par le signe (\*) les lots ayant conservé la détermination manuscrite de FÉRUSSAC.

- Helix monile* Sow., Hist. I, p. 4, pl. 69B, fig. 4. L'ex. figuré, sans localité\* (Cumings, Sowerby).
- H. heligmoida* d'Orb., Hist. I, p. 5, pl. 72, fig. 12. Sept ex., Guayaquil (Gaudichaud : Muséum ? et coll. Rang). Guayaquil est la localité-type.
- H. microdonta* Desh., Hist. I, p. 6, pl. 72, fig. 13. L'hotype figuré, sans localité\* (d'Orbigny).
- H. lingulata* Fér., Hist. I, p. 6, pl. 69D, fig. 1. Six types, Antilles\* (Guérin) et Cuba\* (de la Sagra).
- H. cheilostropha* d'Orb., Hist. I, p. 7, pl. 69D, fig. 5. Au Muséum : un type de d'Orbigny, Monte Grande, Chiquitos.
- H. pollodonta* d'Orb., Hist. I, p. 8, pl. 69C, fig. 2-6. Muséum : 2 types, Pamparuis, Laguna.
- H. paupercula* Lowe, Hist. I, p. 8, pl. 69D, fig. 6. Sept ex., Madère (coll. Rang).
- H. ammoniformis* d'Orb., Hist. I, p. 9, pl. 69B (non 69F), fig. 1. Muséum : 4 types, Yungas.
- H. complanata* Desh., Hist. I, p. 9, pl. 69B, fig. 2. Types non localisés.
- H. helicycloides* d'Orb., Hist. I, p. 10, pl. 69B, fig. 3. Un ex. de la coll. Rang, pays des Yuracarés (localité-type) ; au Muséum : 4 types, même localité.
- H. contorta* Fér., Hist. I, p. 10, pl. 51A, fig. 2. — Férussac, Voy. de l'Uranie, p. 467. Types non localisés.
- H. discordialis* Fér., Hist. I, p. 13, pl. 74, fig. 1. L'hotype figuré, sans localité\* (Sowerby).
- H. Gaimardi* Desh., Hist. I, p. 14, pl. 72, fig. 6-10. Deux ex. (14 mm et 12 mm), « Ile de France » (Lesson et Garnot *in* coll. Rang). Syn. « = *H. discoides* Less. ».
- H. nautiliformis* Desh., Hist. I, p. 14, pl. 72, fig. 11. Quatre types, Italie (Porro, 1839 ; Muséum).
- H. coactiliata* Fér., Hist. I, p. 18, pl. 72, fig. 1-5. Var. *a* Desh. (variété figurée) : 5 types, Mexique ; var. *b* Desh. : 4 types, Mexique\* (Duclos).
- H. circumplexa* Fér., Hist. I, p. 19, pl. 84, fig. 5, 6. L'hotype figuré et 2 paratypes, Brésil (Descourtils ; Muséum) et un ex., sans localité (coll. Rang).
- H. costellata* d'Orb., Hist. I, p. 19, pl. 83, fig. 1, 2. Cinq types de Férussac, « Opara, Sud See »\* (Cumings, Parreys) : il s'agit probablement de l'île

- Oparo dans le Pacifique. Deshayes s'est servi, pour décrire sa var. *a*, de 2 autres ex. déterminés par Férussac : « *Helix costellata* var. ? » et provenant de Montevideo\* (d'Orbigny *in coll. Fér.*).
- H. quadrata* Fér., Hist. 1, p. 20, pl. 69C, fig. 11, 12. Quatre types, Juan Fernandez\* (Cuming).
- H. frigida* Jan et Crist., Hist. 1, p. 30, pl. 69F, fig. 11-14. Trois ex. dont l'ex. figuré ?, Italie du Nord.
- H. setipila* Ziegl., Hist. 1, p. 31, pl. 69F (non 68), fig. 1-5. Quatre ex. dont l'ex. figuré ?, Sicile. Syn. = *H. spinosula* Jan (selon Deshayes), 2 ex. de Jan, Italie méridionale.
- H. colubrina* Jan et Crist., Hist. 1, p. 33, pl. 69F, fig. 15-18 (et 19, 20 ?). Var. *a* Desh. : 3 types dont l'ex. figuré fig. 15-18, Italie\* (Jan) ; var. *b* Desh. (= *H. Schmidtii* Ziegl., selon Desh.) : 2 ex. dont l'ex. des fig. 19, 20 ?, Carniole (Michaud : coll. Fér. ?).
- H. cingulella* Ziegl., Hist. 1, p. 34, pl. 69J, fig. 1-4. Trois ex. semblables aux fig., hautes montagnes du lac de Côme\*. La détermination de Férussac est celle-ci : « *Helix frigida* Jan var. *a insubrica* Jan-*Helix intermedia* var. nob. »
- H. phalerata* Ziegl., Hist. 1, p. 34, pl. 69E, fig. 11 et 18-22. Deux ex. (fig. 19, 20) et un ex. (fig. 22), Carniole.
- H. faustina* Ziegl., Hist. 1, p. 35, pl. 69J, fig. 5-8. Deux ex. d'auteur dont l'ex. figuré ?, Galicie ? Syn. = *H. Volhyniensis* Andr. (selon Deshayes), un ex., Volhynic\* (Krynicky).
- H. tetrazona* Jan, Hist. 1, p. 38, pl. 69J, fig. 20-23. Deux ex. semblables aux fig., Alpes du Vicentin\* (Jan).
- H. Porto Sanctana* Sow., Hist. 1, p. 42, pl. 67, fig. 9, 10. Dix ex., Madère\*. Var. *gigantea* Sow. = *H. Lowii* Fér. (*H. Loweana*, étiquette de Férussac), 3 types, « fossile de Porto Santo ou de Ténériffe »\* (Sowerby) : voir Férussac, Bull. Zool. 11, p. 89.
- H. concisa* Fér., Hist. 1, p. 46, pl. 78, fig. 3, 4. — Férussac, Voy. de l'Uranie, p. 470. L'holotype figuré, Rawack\* (Freycinet).
- H. Quoyi* Desh., Hist. 1, p. 47, pl. 73B, fig. 4. Muséum : l'holotype figuré, Célèbes (Quoy et G., expéd. d'Urville).
- H. trigrammefora* (sic) d'Orb., Hist. 1, p. 47, pl. 69H, fig. 11, 12. Trois ex., sans localité (coll. Fér. ?) ; au Muséum : 5 types, Valle Grande.
- H. bigonia* Fér., Hist. 1, p. 49, pl. 70, fig. 2. L'holotype figuré et un paratype, sans localité\*.
- H. Atropos* Fér., Hist. 1, p. 56, pl. 69H, fig. 13, 14. L'holotype figuré et un paratype, baie de Diego-Suarez\* (Goudot) ; ex. contrôlés par E. Fischer (*J. Conchyl.*, 1952, pp. 15, 16).
- H. Lachesis* Fér., Hist. 1, p. 57, pl. 69H, fig. 3, 4. L'holotype figuré et un paratype, baie de Diego-Suarez\* (Goudot) et 2 autres ex., Madagascar. Ces derniers ex. sont les types de la var. *monacha* Mab. ; E. Fischer en a figuré un (*supr. cit.*, pp. 19, 20 ; pl. 1, fig. 16, 17).

- II. Clotho* Fér., Hist. 1, p. 57, pl. 69I, fig. 3. Deux paratypes non figurés, sans localité. Ces ex. ont été figurés par Crosse et Fischer in Grandidier (pl. 8, fig. 1, 1a) ; voir E. Fiseher, *supr. cit.*, p. 20.
- II. Japonica* Fér., Hist. 1, p. 58, pl. 69H, fig. 5, 6. L'holotype figuré et le paratype cité, Japon\* (Cuming).
- II. consanguinea* Fér., Hist. I, p. 59, pl. 69H, fig. 1, 2. L'holotype figuré et un paratype, Madagascar ; voir E. Fiseher, *supr. cit.*, pp. 11, 12.
- II. Puzolzi* (non *Pouzolzi*) Desh., Hist. 1, p. 59, pl. 69G, fig. 1-8 ; atlas I, errata. Le type des fig. 5-8, Dalmatie ?\* et 5 types de l'*III. Ragusana* Fér. dont l'ex. des fig. 1, 2 ?, Dalmatie, Raguse et île Meleda et Raguse\* (Partsch) ; var. = *II. Montenegrina* Ziegl. (selon Deshayes), un ex. de Ziegler, Dalmatie.
- II. granulosa* Fér., Hist. 1, p. 61, pl. 69H, fig. 7-10. L'holotype figuré et un paratype, baie de Diego-Suarez\* (Goudot) ; voir E. Fiseher, *supr. cit.*, p. 25.
- II. heliaca* d'Orb., Hist. I, p. 64, pl. 69K, fig. 17-20. Muséum : 4 ex. dont 2 conformes aux fig., Chiquitos (d'Orbigny ; Cuming).
- II. brasiliiana* Desh. (= *II. serpens* d'Orb.), Hist. I, p. 65, pl. 75B, fig. 6, 9. Néant.
- II. nuberculata* Desh., Hist. 1, p. 66, pl. 69I, fig. 1-4. Néant.
- II. desidens* Rang, Hist. I, p. 67, pl. 69K, fig. 5-7. — Rang, Mag. de Zool., 1834, cl. V, pl. 48. — Férussac, Bull. Zool. II, p. 12. Sept types, Mtgne Pelée (coll. Rang).
- II. Audouini* d'Orb., Hist. 1, p. 67, pl. 73B, fig. 3. Muséum : 3 types, Yungas.
- II. Sayi* Binn., Hist. I, p. 70, pl. 69I, fig. 2. L'ex. figuré, sans localité.
- II. coronata* Desh., Hist. I, p. 71, pl. 69K, fig. 1-4. Néant.
- II. auridens* Rang, Hist. I, p. 72, pl. 69K, fig. 8-11 — Rang, Mag. de Zool., 1834, cl. V, pl. 49 — Férussac, Bull. Zool. II, p. 12. Cinq types (10 à 15 mm), Mtgne Pelée (coll. Rang).
- II. texasiana* Moric., Hist. 1, p. 74, pl. 69D, fig. 2 — Férussac, Bull. Zool. II, p. 85. Néant ; syn. = *II. triodonta* Crist. et Jan, 4 ex., sans localité (Cristofori).
- II. diodonta* Megl., Hist. I, p. 75, pl. 51A, fig. 1. Trois ex., Banat\* (Partsch).
- II. pustula* Fér., Hist. I, p. 78, pl. 50, fig. 1. Types non localisés.
- II. Filiola* Fér., Hist. I, p. 82, pl. 86, fig. 1. Un paratype de 5,6 mm, île Tonga\* (Quoy).
- II. spirorbis* Fér., Hist. I, p. 83 ; espèce non figurée. Un type de 3,6 mm, Rio de Janeiro\* (Gaudichaud).
- II. minutalis* Fér., Hist. I, p. 83 ; espèce non figurée (atlas I, errata). Types non localisés.
- II. bracteola* Fér., Hist. 1, p. 84, pl. 86, fig. 2. Deux types (5,3 et 5,5 mm), Martinique\* (Rang) et 6 ex., même loc. (coll. Rang).

- H. omalomorpha* d'Orb., Hist. I, p. 84, pl. 69C, fig. 1. Muséum : 2 types (26 mm et 16 mm), Capitana et Enquisivi.
- H. chalicophila* d'Orb., Hist. I, p. 85, p. 83, fig. 7, 8. Trois ex. nommés par Férussac « *H. copulata* d'Orb. », Chiquitos\* (d'Orbigny) ; au Muséum : 4 types, Chiquitos.
- H. trochilioneides* d'Orb., Hist. I, p. 85, pl. 69C, fig. 7, 8. Quatre ex. nommés par Férussac « *H. Limacensis* d'Orb. », Lima (d'Orbigny) et Laguna\* (d'Orb.) ; 3 ex., mêmes localités (coll. Rang) ; Muséum : 6 types, mêmes loc.
- H. orbicula* d'Orb., Hist. I, p. 86, pl. 83, fig. 5, 6. Deux ex. non figurés, Rio Grande (Rang ; coll. Fér. ?) ; Muséum : 3 ex. d'auteur, Rio Grande.
- H. skiaphila* d'Orb., Hist. I, p. 86, pl. 83H, fig. 8, 10. Muséum : 3 ex. d'auteur, Yuraearés.
- H. bounoboena* d'Orb., Hist. I, p. 87, pl. 84, fig. 7, 8. Muséum : 2 types, Chiquitos.
- H. Georgiana* Quoy, Hist. I, p. 88, pl. 84, fig. 3, 4. Muséum : l'holotype, Port du Roi Georges (Quoy et G., expéd. d'Urville).
- H. pardalina* Desh., Hist. I, p. 88, pl. 83, fig. 3, 4 — *Helicella undulata*, Férussac, inscrip. manuse. Sept types, Oehetaroa\* (Cuming, Parreys).
- H. contortula* Fér., Hist. I, p. 89, pl. 86, fig. 4. Types non localisés.
- H. modicella* Fér., Hist. I, p. 90, pl. 86, fig. 3. Types non localisés.
- H. disculus* Desh., Hist. I, p. 95, pl. 89, fig. 6. Néant.
- H. dissidens* Desh., Hist. I, p. 97, pl. 84, fig. 1, 2. Néant.
- H. hylephila* d'Orb., Hist. I, p. 99, pl. 87, fig. 3. Muséum : 3 types, Monte Grande, Chiquitos.
- H. Belangeri* Desh., Hist. I, p. 100, pl. 69I, fig. 4. Le type figuré ?, Pondichéry (Bélangier ; Muséum) et un autre ex. de Bélangier, même loc., nommé *H. Malabarica* Val. (voir Pfeiffer, Symb. I, p. 65 et II, p. 87).
- H. apicina* Lmk., Hist. I, p. 104, pl. 85, fig. 19-22. Quatre ex., Brives et Narbonne\* (« = *H. Narbonnensis* Req. »).
- H. Chastellii* Fér., Hist. I, p. 106, pl. 80, fig. 4. Trois types non figurés.
- H. lacticina* Ziegl., Hist. I, p. 107, pl. 69A, fig. 2. Cinq ex., localité incertaine\* (= *H. livescens* Jan).
- H. bulbina* Desh., Hist. I, p. 108, pl. 85, fig. 14-18. Néant.
- H. Estella* d'Orb., Hist. I, p. 109, pl. 73B, fig. 1, 2 — d'Orbigny, Voy., pl. 25, fig. 5-8. Muséum : var. *A* d'Orb. (Hist., fig. 2 ; Voy., fig. 5-7), 3 types, Enquisivi ; var. *B* d'Orb. (Hist., fig. 1 ; Voy., fig. 8), 2 types, Chuquisaca ; var. *C* d'Orb., un type, Tasajos.
- H. lens* Fér., Hist. I, p. 110, pl. 66, fig. 2. Deux ex. conformes à la fig., Grèce (coll. Fér.). Cette figure ne se rapporte pas à l'espèce *H. lens* Fér. de Ténériffe (Prodr. n° 153) ; il s'agit ici de *H. lens* auct., espèce vivant principalement en Grèce.
- H. stephanophora* Desh., Hist. I, p. 111, pl. 90, fig. 8. Néant.

- H. Raspaillii* Payr., Hist. I, p. 118, pl. 96, fig. 13. L'ex. cité par Deshayes p. 61, environs de Bonifacio\* (Pouzolz). Férussac l'avait nommé « *H. Puzolzii* Payr. » ; cet ex. a ensuite servi de type à Mabilley pour son *H. acropachia*.
- H. Codringtoni* Gray, Hist. I, p. 119, pl. 97, fig. 14-19 (non 7-12). Quatre ex. de Morée\* nommés par Férussac « *H. Navarensis* », soit les 2 ex. figurés fig. 14-17 (= *H. Poloponensis* Beck) et les 2 ex. figurés fig. 18, 19 (var. *a* = *H. Ferussaci* Jan). Fossile : un ex. de *H. Ferussaci* Jan, brèches ferrugineuses de Naples.
- H. Lucasii* Desh., Hist. I, p. 122, pl. 96, fig. 8-12. Deux ex. se rapportant à la var. figurée fig. 10, Algérie.
- H. simia* Fér., Hist. I, p. 127, pl. 28B, fig. 2. Un paratype non figuré, Madère\* (Bowdich).
- H. multistriata* Desh., Hist. I, p. 135, pl. 27A, fig. 4-6 — *H. circumtexta*, Férussac, inscrip. manusc. Sept types dont l'ex. des fig. 4, 5, Cuba (Guérin) ; 3 types dont l'ex. des fig. 6 ?, Cuba\* et 3 autres ex. de Cuba\* (Guérin).
- H. tridentina* Fér., Hist. I, p. 152, pl. 54A, fig. 4-6. L'holotype figuré, « Antilles ? »\*.
- H. magica* Fér., Hist. I, p. 153, pl. 54A, fig. 7-9. Néant.
- H. Dupetit-Thouarsii* Desh., Hist. I, p. 169, pl. 97, fig. 8-10. Six types dont l'ex. figuré, Monterey, Californie (Dupetit-Thouars ; Muséum).
- H. Poeyi* Petit, Hist. I, p. 170, pl. 97, fig. 1-3. Muséum : l'holotype figuré par Petit ? (ex. de 26 mm), Cuba.
- H. multizona* Less., Hist. I, p. 174, pl. 106, fig. 1-5. L'ex. sans doute figuré fig. 1, 2, Waigiou\* (Sowerby) ; l'étiquette de Férussac porte ceci : « *H. tenuiradiata* Quoy var. not. an sp. dist. ? ». Au Muséum : le type de *H. tenuiradiata* Q. et G. (= *H. multizona* Less. var. *a* Desh. ?), Port Dorey (expéd. d'Urville).
- H. labium* Fér., Hist. I, p. 175, pl. 64, fig. 6. Types non localisés.
- H. bipartita* Fér., Hist. I, p. 176, pl. 75A, fig. 1 et 107A, fig. 12, 13. L'holotype figuré pl. 75A et un paratype, sans localité\* (Richard).
- H. quaesita* Desh., Hist. I, p. 179, pl. 10B, fig. 10-12. L'holotype figuré, sans localité\* (Sowerby).
- H. semipartita* Desh., Hist. I, p. 187, pl. 89, fig. 5. Néant.
- H. tumens* Desh., Hist. I, p. 188, pl. 89, fig. 4. Le type figuré ? ; ex. de 41 mm trouvé sans étiquette dans la coll. Férussac.
- H. exquisita* Desh., Hist. I, p. 190, pl. 96, fig. 1-4. Néant.
- H. expolita* Desh., Hist. I, p. 190, pl. 87, fig. 1. Néant.
- H. nauziloides* Val., Hist. I, p. 191, pl. 37A, fig. 4. Holotype non localisé ; au Muséum : 3 ex. anciens, le Cap (donateur ?, sans date).
- H. ammonia* Val., Hist. I, p. 197, pl. 37A, fig. 1. Muséum : 3 ex. conformes aux fig., Bombay (Cloué, 1850).

- H. nitidiuscula* Sow., Hist. I, p. 200, pl. 28B, fig. 1. Quatre ex., Madère (Bowdich).
- H. pellicula* Fér., Hist. I, p. 204, pl. 105, fig. 1. L'holotype figuré et 2 paratypes, St-Domingue\* (Richard).
- H. gularis* Say, Hist. I, p. 208, pl. 51A, fig. 4. Quatre ex., Pensylvanie.
- H. Hebe* Desh., Hist. I, p. 211, pl. 37A, fig. 5. L'holotype figuré, Jamaïque (coll. Rang); Rang avait écrit ceci : « *H. fragilis* Lam. — Jamaïque — hébé ».
- H. coarctata* Fér., Hist. I, p. 216, pl. 10B, fig. 6, 7. L'holotype figuré, sans localité\* (Sowerby).
- H. obliquata* Desh., Hist. I, p. 219, pl. 28A, fig. 3, 4. Type non localisé.
- H. filosa* Desh., Hist. I, p. 220, pl. 29A, fig. 22, 23 — *H. multizonata*, Férussac, inscrip. manusc. L'holotype figuré, sans localité\* (Sowerby).
- H. exornata* Desh., Hist. I, p. 220, pl. 17A, fig. 9-11 — *H. ornata* Desh., atlas I, expl. des pl. Un type (ex. brisé), sans localité; il existait un 2<sup>e</sup> spécimen dans la coll. Férussac.
- H. incerta* Fér., Hist. I, p. 221, pl. 105, fig. 2. Trois paratypes non figurés, St-Domingue et 2 ex., Trinité (Cuming; coll. Fér.?).
- H. gibbosula* Desh., Hist. I, p. 224, pl. 107, fig. 1-3. Néant.
- H. punctulata* Sow., Hist. I, p. 225, pl. 28B, fig. 3, 4. Trois ex. dont l'ex. figuré fig. 3, Porto Santo, Madère\* (Bowdich) et 5 autres ex. non figurés, mêmes loc.
- H. Bowdichiana* Fér., Hist. I, p. 226, pl. 28B, fig. 5, 6 (= *H. punctulata* Sow. forme fossile, selon Deshayes). L'holotype figuré et 4 paratypes, Porto Santo.
- H. tessellata* Fér., Hist. I, p. 232, pl. 17A, fig. 12, 13. L'holotype figuré, « Sardaigne ?-îles Baléares »\*.
- H. sicana* Fér., Hist. I, p. 244, pl. 28B, fig. 7 — *H. sicana* et *H. sicula*, Férussac, inscrip. manusc. Variété figurée : 2 types (« *H. sicana* — var. : *H. praetexta* Jan »), Palerme\* et 2 lots, Sicile (coll. Fér. ?); « var. *fasciata* » (*H. sicula*) : 4 ex., Palerme\* et un lot, Sicile (coll. Fér. ?); forme scalaire : 3 ex., Sicile (coll. Fér. ?).
- H. granulata* Quoy, Hist. I, p. 249, pl. 28A, fig. 9, 10. Deux ex. d'auteur semblables aux fig., Nlle-Guinée (Quoy et G. in coll. Rang et Férussac).
- H. Cailliaudi* Desh., Hist. I, p. 253, pl. 93, fig. 5, 6. Muséum : 2 ex. semblables au type figuré dans le Mag. de Zool., Manille (Cailliaud et Eydoux et Souleyet).
- H. nivosa* Sow., Hist. I, p. 255, pl. 17A, fig. 1-8. Trois ex., Porto Santo\* (Roussel). Syn. = *H. phlephora* Lw., 2 lots, Madère, Porto Santo (coll. Fér. et Rang).
- H. subplicata* Sow., Hist. I, p. 272, pl. 9B, fig. 8, 9 et 17A, fig. 14, 15. Deux ex. dont l'ex. figuré, Porto Santo\* (Bowdich) et 3 ex. fossiles, même loc.

- H. Humboldtiana* Val., Hist. I, p. 273, pl. 17A, fig. 16, 17. Muséum : 3 ex. dont le type figuré ??, Mexico (achat Sallé, 1834).
- H. dionaea* Desh., Hist. I, p. 276, pl. 28A, fig. 11, 12. Type non localisé.
- H. oviformis* Grat., Hist. I, p. 286, pl. 10A, fig. 6 et 10 B, fig. 1, 2. Les 2 ex. figurés ?, Madagascar\* ; Férussac les avait nommés « *H. Goudotiana* var. » : voir E. Fischer, *J. Conchyl.*, 1950, pp. 99, 100.
- H. Goudotiana* Fér., Hist. I, p. 286, pl. 10A, fig. 4, 5 — *H. amphibulima* Fér., atlas I, expl. des pl. L'holotype figuré (48,5 mm) et un paratype (53 mm), Madagascar\* (Goudot) ; voir E. Fischer, *supr. cit.*, pp. 101, 102.
- H. echinophora* Fér., Hist. I, p. 287, pl. 10A, fig. 7-9. Quatre ex., Madagascar ; les ex. n° 1 et 2 sont les types figurés par Deshayes ; les ex. n° 2 et 3 ont été figurés par Crosse et Fischer (*in* Grandidier, pl. 4, fig. 1, 1a, 1b) : voir E. Fischer, *supr. cit.*, pp. 102, 103 ; le 4<sup>e</sup> ex., très jeune, n'est pas un *H. echinophora* (détermination de E. Fischer).
- H. Villae* Desh., Hist. I, p. 295, pl. 90, fig. 9. Néant.
- H. melanocheila* Val., Hist. I, p. 296, pl. 107, fig. 14-16. Muséum : types non localisés.
- H. egregia* Desh., Hist. I, p. 302, pl. 102, fig. 17, 18. Néant.
- H. oenostoma* Desh., Hist. I, p. 304, pl. 95, fig. 5. Néant.
- H. turgens* Desh., Hist. I, p. 316, pl. 108C, fig. 11, 13. Néant.
- H. fulgens* Sow., Hist. I, p. 318, pl. 108C, fig. 1, 2, 9, 10. L'ex. figuré fig. 9, 10 ?, Manille.
- H. translucida* Quoy, Hist. I, p. 322, pl. 63B, fig. 5. Muséum : un type, Nlle-Guinée.
- H. gyrina* Desh., Hist. I, p. 334, pl. 63B, fig. 4. Muséum : type non localisé.
- H. grata* Michel., Hist. I, p. 335, pl. 63B, fig. 1-3. Muséum : un type de Michelin, Océanie et 2 types de *H. acuta* Q. et G., Nlle-Guinée.
- H. Listeri* Gray, Hist. I, p. 359, pl. 62A, fig. 1-3. L'ex. figuré, Manille (Godefroy, 1834 ; Muséum).
- H. discus* Desh., Hist. I, p. 360, pl. 62A, fig. 4. Néant.
- H. securiformis* Desh., Hist. I, p. 362, pl. 64A, fig. 5, 6. Un type probable : ex. conforme aux fig. et nommé « *H. securiformis* Val. », la Réunion (Goudot, 1829 ; Muséum).
- H. scalprum* Val., Hist. I, p. 362, pl. 62A, fig. 2-4. Muséum : type non localisé.
- H. Eucharis* Desh., Hist. I, p. 363, pl. 64A, fig. 7, 8. Néant.
- H. acies* Partsch., Hist. I, p. 366, pl. 80, fig. 7 — *H. acumen*, Férussac, inscrip manusc. 2 ex. de Partsch, île Meleda, Dalmatie\* (= *H. acumen* et *H. acutumargo* Ziegl., Mke.) et un autre ex., Dalmatie.
- H. perplexa* Fér., Hist. I, p. 378, pl. 56A, fig. 1. Muséum : 3 ex., Antilles (coll. Roussel).
- H. Rangiana* Fér., Hist. I, p. 384, pl. 65, fig. 1. Cinq types (« *H. Rangiana* Desh. »), Collioure et 3 paratypoides, Pyrénées-Orientales (coll. Rang).



- H. bifurcata* Desh., Hist. I, p. 386, pl. 54B, fig. 1. Muséum : un ex. ancien, Cayenne (Kéraudren, sans date).
- H. cicercula* Desh. (*Hélice pisiforme*), Hist. I, p. 390, pl. 107, fig. 4-10. Muséum : 2 lots nommés « *H. pisiformis* », Vera Cruz (achat Vimont, 1878 ; donateur ?, sans date).
- H. Reboulîi* Leufroy (espèce fossile), Hist. I, p. 394, pl. foss. 1, fig. 1. Quatre ex. non figurés : 2, sans localité\* (de Serres) et 2 de Pézenas, France\*.
- H. Turonensis* Desh. — *H. eversa* Desh. — *H. phaseolina* Desh. (espèces fossiles), Hist. I, pp. 394, 395, 396, pl. foss. 1, fig. 2-7. Néant.
- H. convoluta* Desh., Hist. I, p. 401, pl. 87, fig. 2. Néant.
- H. xystrera* Val., Hist. I, p. 401, pl. 62A, fig. 5-7. L'ex. figuré par Deshayes et un autre ex., Madagascar (coll. Fér.) ; voir E. Fischer, *J. Conchyl.*, 1952, pp. 31, 32.

B. — *Espèces non mentionnées dans l' « Histoire des Mollusques » mais citées dans une publication de FÉRUSSAC.*

Les espèces suivantes se trouvent mentionnées par FÉRUSSAC dans les *Mémoires géologiques* (1814), la *Concordance des Mollusques de la Grande Bretagne* (1820), le *Catalogue des espèces recueillies par M. Rang* (1827) et dans le *Bulletin Zoologique*, 2<sup>e</sup> sect. (1835).

- Helix Ramondi* Brong. = *H. striata* DeFr. (espèce fossile), Mém. géol., p. 57. Trois ex., « château St-Romain »\* : St-Romain en Côte-d'Or ? ; 3 ex., environs de Landau\* (Hammer) et 4 ex. non déterminés par Férussac : Béziers (de Serres) et envir. d'Angers (Morin).
- H. de Ronca* Brard (espèce fossile), Mém. géol., p. 58. Un ex., « dans le tuffa calcarière »\* : val de Ronca ? (abbé Maraschini). Syn. = *H. damnata* Brong. ?, un ex., Ronca (Maraschini).
- H. aquensis* de Serres (espèce fossile, non mentionnée par Férussac), 2 ex., « terrains tertiaires supérieurs », environs d'Aix \*(de Serres).
- H. maguntina* « Brong., DeFr. » (espèce fossile, non mentionnée par Férussac), 3 ex., Strasbourg ?\* (Hammer).
- H. fusca* Montg., Concord., pp. 24, 25, 26. Un lot, Scarborough\* (Bean) et 2 autres lots de Scarborough ; cette espèce était d'abord inconnue à Férussac (voir Prodr., p. 86).
- H. (Helicogena) contusula* Fér., Cata. de Rang, n<sup>o</sup> 13 — Rang, Voy., n<sup>o</sup> 2. Trois types, Rio de Janeiro (coll. Rang) et 2 autres ex. de Rio (Gaudichaud, 1833 ; coll. Fér. ?).
- H. (Helicodonta) detecta* Fér., Cata. de Rang, n<sup>o</sup> 20 — Germain, Masc., pp. 99-102. Trois types dont les 2 ex. figurés par Germain (pl. IV, fig. 25-30), la Réunion (coll. Fér.) et 3 syntypes de *H. subdetecta* Germ. (*H. detecta* Fér. var. *a*), ex. figurés par Germain, pl. IV, fig. 31-37, la Réunion (Goudot, 1829).

- H. (Helicodonta) delibata* Fér., Cata. de Rang, n° 21 — voir Germain, Masc., p. 93. Cinq ex., la Réunion (Goudot, 1829 ; coll. Fér. ?) et 3 ex., île Maurice (Mathieu ; coll. Fér. ?).
- H. (Helicella) nulla* Fér., Cata. de Rang, n° 24 — voir Germain, Masc., p. 147. Quatre types, la Réunion\* (Goudot et Rang).
- H. (Helicella) turbida* Fér., Cata. de Rang, n° 25 — voir Germain, Masc., p. 160. Huit types, la Réunion (coll. Rang).
- H. (Helicella) praetumida* Fér., Cata. de Rang, n° 26. Cinq types, la Réunion, « bois humides » \*(Rang, Goudot).
- H. (Helicella) familiaris* Fér., Cata. de Rang, n° 27. Sept types, Cap de Bonne Espérance.
- H. atrolabiata* Kryn., Bull. Zool. II, p. 21. Trois ex., Caucase ?\*.
- H. Krynickii* Andr., Bull. Zool. II, p. 21. Quatre ex., Crimée\* (Krynicky).
- H. Ravergiensis* Fér., Bull. Zool. II, p. 21. Quatre types, Tiflis\* (Ravergie).
- H. pallida* Gray, Bull. Zool. II, p. 32. Trois ex., Indes orient.\* et 2 ex., Cochinchine (Eydoux et Souleyet, 1837 ; Muséum). Syn. = *H. Cachemyriana* Val., 2 ex., Cachemire (Jacquemont, 1833 ; Muséum).
- H. alpina* Ménétries, Bull. Zool. II, p. 58. Cinq ex., Caucase\*.
- H. (Helicogena) Berlandieriana* Moric., Bull. Zool., II, p. 85. Trois ex., Texas\*.
- H. plicata* Say, Bull. Zool. II, p. 85. Un ex., sans localité\* (« var. ») et 3 ex. nommés « *H. operculata* Val. », Amérique sept.
- H. Rosetti* W. et B., Bull. Zool. II, p. 90. Huit ex., Canaries, Ténériffe\* (Webb, Richard).
- H. Berthelotii* Fér., Bull. Zool. II, p. 90 — voir Hist. I, pp. 372, 373. Trois types, Ténériffe\* (Webb). Syn. = *H. hispidula* Webb.
- Carocolla spinosa* Lea, Bull. Zool. II, p. 100. Deux ex., Alabama.

C. — *Espèces de FÉRUSSAC non publiées*  
par FÉRUSSAC et par DESHAYES.

Ces espèces, créées par FÉRUSSAC, sont demeurées presque toutes *nomen nudum*. Elles sont en général mentionnées dans le *Catalogue de la collection Férussac* (Anonyme, 1837). Quelques-unes sont également mentionnées par L. PFEIFFER (*Symbolae* I, 1841 et II, 1842).

- Helix fimbriata* (Fér.) Bourg., voir Germain, Syrie, p. 115. Le type de Férussac figuré par Germain (pl. VI, fig. 17, 18), Perse\* (Richard).
- H. insignis* (Fér.) d'Orb., voir d'Orbigny, Voy., pp. 247, 248. Treize types, Coquimbo\* (Gaudichaud) et 4 autres types de Férussac, Coquimbo.
- H. serrula* Fér., 5 ex., Alger (Sowerby) ; cette espèce est probablement l'*Helix serrula* Morelet.
- H. ursula* Fér., Pfeiffer, Symb. II, p. 107. Six ex., Tanger.

- H. (Helicigona) finitima* Fér., Pfeiffer, Symb. II, p. 78. Un ex., Tanger\* (Goudot).
- H. involuta* Fér., 3 ex., Nlle Galles du Sud. Syn. (non de Férussac) = *Nanina insculpta* Pfr.
- H. (Helicostyla) flavida* Fér., Pfeiffer, Symb. II, p. 79. Sept ex., île Pitcairn\* (Cuming, Parreys ; Morelet). Syn. (non de Férussac) = *H. Adamsi* Pfr.
- H. (Helicella) fulgida* Fér., 8 ex., île Pitcairn\* (Cuming, Parreys).
- H. lenticularis* Fér., un ex., Borabora\* (Lesson).
- H. (Helicigona) lenticulata* Fér., 4 ex., Oparo\* (Cuming, Parreys).
- H. (Helicogena) virideincta* Fér., 2 ex., Luçon\*.
- H. (Helicella) perexigua* Fér., 5 ex., Juan Fernandez\* (Cuming, Parreys).
- H. (Helicostyla) trochulus* Fér., 3 ex., Demerara\* (Mowe, Sowerby).
- H. exigua* (sic) Fér., un ex., Demerara\* (Pfeiffer). Syn. (non de Férussac) = *H. parvula* Guild.
- H. (Helicella) fulgurialis* Fér., 3 ex., Concepcion, Chili\* (Cuming, Parreys).
- H. (Helicella) narini* Fér., un ex., province de Bahia\*.
- H. Castor* Fér., Pfeiffer, Symb. II, p. 70 — voir *H. Castor* Val., Beck, Index, *Helicella* n° 20. Trois ex., la Réunion\* (Goudot) et 3 autres ex. de la Réunion (coll. Fér. ?).
- H. Pollux* Fér., Pfeiffer, Symb. I, p. 70 et II, p. 96. Six ex., la Réunion (Goudot, 1834 ; coll. Fér. ?).
- H. carinifera* Fér., 2 ex., Ste-Marie de la Réunion\* (Goudot) et 7 ex., la Réunion (Goudot ; coll. Fér. ?) ; « var. = *H. tenuis* Fér. ? », 3 ex., île Maurice\* (Rang).
- H. Immiretiana* (sic) Fér., un ex., Koutaïs\* (Ravergie).
- H. sulculosa* Fér., un ex., Palerme (coll. Fér. ?) ; une étiquette de Férussac, sans ex., indique aussi : « Scio ou Sestos ».
- H. bituberculata* Fér., un ex., « Portugal ? »\* (Christ. de Dan.).
- H. semiusta* Fér., un ex., sans localité\* (Sowerby).
- H. (Helicigona) Menkeana* Fér., un ex., sans localité\* (Sowerby) ; ce n'est pas un *Bulimus* (voir Pfeiffer, Symb. I, p. 65 et II, p. 88).

D. — *Autres espèces non publiées par FÉRUSSAC et non décrites par DESHAYES dans l' « Histoire des Mollusques ».*

Ces espèces, représentées dans la collection FÉRUSSAC, sont des espèces créées par des auteurs contemporains de FÉRUSSAC. Nous allons les énumérer par faunes géographiques. L'*Helix Monrovia* et l'*Helix Ekloniana* retiendront particulièrement notre attention.

- H. Monrovia* Rang, voir Rang, Voy., n° 7, pl. III, fig. 3. Un type, Cap Mésurade (coll. Rang) et un ex. d'auteur, côte d'Afrique\* (Rang in coll. Fér.).

*H. Eklonii* Beck, voir *Theba Ekloniana*, Beek, Index, *Theba* n° 11. Quatre ex., « Santags riveer », Afrique du Sud\*.

Espèces de Madère et Porto Santo :

*H. bifrons* Lw. — *H. duplicata* Lw. = *H. bicarinata* Sow. — *H. turricula* Lw. — *H. thiarella* W. et B. — *H. obtecta* Lw. (dont 5 ex. fossiles) — *H. depauperata* Lw. — *H. Maderensis* Wood = *H. cyclostoma* Mke. — *H. leptosticta* Lw. — *H. dealbata* Lw. (un ex., « var.  $\alpha$  ») — *H. arcta* Lw. — *H. consors* Lw. — *H. compacta* Lw. — *H. abjecta* Lw. — *H. arridens* Lw. — *H. calva* Lw. — *H. Bulveriana* Lw. — *H. tectiformis* Sow. — *H. rotula* Lw. — *H. cheiranthicola* Lw. — *H. oenostoma* Lw.

Espèces des Canaries :

*H. tumulorum* W. et B. (10 ex. de Webb) — *H. monilifera* W. et B. (un ex. de Webb) — *H. lemniscata* W. et B. (5 ex. de Webb) — *H. sarcostoma* W. et B. (6 ex. de Webb, Lanzarote).

Espèces européennes et méditerranéennes :

*H. compressa* Ziegl. — *H. excavata* Bean (Scarborough) — *H. alliardia* Miller = *H. foetida* Stark (Scarborough : Bean et Kenyon) — *H. Scarboroughensis* Alder et Turton (Scarborough : Bean) — *H. umbrosa* Partseh (Vienne) — *H. egregia* Ziegl. — *H. monilifera* Mke. = *H. maculosa* Ziegl. — *H. Virletii* Fér. = *H. turbinata* Jan (Morée : Virlet) — *H. obvia* Ziegl. (Potsdam) — *H. Ammonis* Schm. (Vienne : Partsch) — *H. instabilis* Ziegl., Mke. (Galicie : Parreys) — *H. filimargo* « Parr. » (Crimée, Tauride : Krynieki, Parreys) — *H. pustulata* Mgl. Mühlf. (Alexandrie : Olivier ; Corfou : Parreys) — *H. verticillata* « Mühlf. » (4 ex. de Parreys, Dalmatie) — *H. setigera* Ziegl. (Dalmatie : Jan) — *H. Mauritaniensis* Fér. = *H. alabastrites* Mich. (var. *a alba* et *b fasciata* : îles Zaffarines et Algérie) — *H. rugosa* « Mke » (2 ex. de Ziegler, Sieile) — *H. globularis* Ziegl. (Sicile : Parreys) — *H. hospitans* Bonelli (« *affinis sicula* ? » : voir *H. sicula* = *H. sicana* Fér. var., Hist. I, p. 244) — *H. vulgaris* Parr. (2 ex. de Parreys, Tauride) — *H. pumilio* Chemn. (Maroc).

Espèces américaines :

*H. suppressa* Say (Caroline du Sud) — *H. solitaria* Say (Ohio : Say ?) — *H. jejuna* Say (2 ex. de Say, Floride de l'Est) — *H. nana* Beck = *H. erubescens* Guild. (St Thomas : Beek ; Tortola : Guilding ?)<sup>1</sup> — *Carocolla globosa* Brod. (Colombie ?).

(A suivre)

1. Cette espèce a été identifiée anonymement avec *H. nemoralina* Petit.